

FORTE

NOVO



Napomene pri primeni

-  Amonijum jon NH_4 , u zemljištima bogatim sa CaCO_3 , transformiše se u NH_3 , pa je potrebno inkorporirati **FORTE** u zemljište da bi se sprečio gubitak azota.
-  **FORTE** je đubrivo fiziološki kisele reakcije pa se njegova primena na kiselim i lakim peskovitim zemljištima preporučuje uz kalcifikaciju ili fosfataciju sirovim fosfatima.
-  Kod kultura osetljivih na sumpor, treba voditi računa o količini sumpora koja će biti uneta u zemljište (biljne vrste koje imaju osetljive klijance).
-  Za tačno određivanje potrebne količine azota treba vršiti redovnu kontrolu zemljišta N-min metodom.



Zbog čega treba koristiti đubrivo Forte:

- laka primena
- visok kvalitet
- proizvedeno najsavremenijom tehnologijom
- prilagođeno specifičnim uslovima zemljišta i uzgajanih useva
- uz povoljnu cenu, dobijate bolji prinos na Vašim njivama i finansijsku dobit u svom poslovanju.

Agrotim
 **VICTORIALOGISTIC**

Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad
tel. +381 21 4895 400
4895 470, 4886 508
fax. +381 21 4895 468
www.victorialogistic.rs

FORTE 20

FORTE 30

Agrotim
 **VICTORIALOGISTIC**

FORTE 20

FORTE 30

FORTE 20 i 30 su azotna đubriva koja se mogu primeniti pred osnovnu obradu zemljišta, predsetveno u prihrani, ali i folijarno. **Predstavljaju kombinaciju dva makro hranljiva elementa - azota i sumpora.**

FORTE 20 i 30 ne sadrže balastne materije i lako su rastvorljiva u vodi, a mogu se primenjivati za: pšenicu, uljanu repicu, kupusnjaču, lukovice, lucerku i druge leguminoze, jabuke, grožđe, duvan,...

Ne postoji ni jedan proces u biljkama na koji **AZOT** ne utiče. Ishrana biljaka je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji. Đubrivo FORTE doprinosi boljoj ishrani biljaka.

SUMPOR je neophodan u procesu izgradnje aminokiselina (čime utiče na povećanje ukupnog sadržaja proteina), antifungalnih proteina (koji su bitni za odbranu biljaka od štetnih mikro-organizama), glutena kod pšenice (protein koji utiče na poboljšanje pekarskih svojstava).

Zahvaljujući sumporu poboljšava se sinteza proteina, kvalitet zrna i plodova gajenih biljaka kao i prirodna otpornost prema bolestima.

Sumpor doprinosi oslobađanju ostalih hranljivih materija iz teže pristupačnih formi. On takođe podiže nivo pristupačnog fosfora i povećava otpornosti biljaka prema stresnim uslovima spoljne sredine.

Forte 20 i 30 se pakuju u big bag vreće i vreće od 25kg.

FORTE 20

Osnovne karakteristike

FORTE 20 predstavlja kombinaciju azota i sumpora u odnosu 20% N i 24% S.

Azot se nalazi u formi amonijum jona u celokupnoj količini. **Sumpor** se nalazi u obliku SO₃. **Amonijum jon** je teže pokretan u zemljištu čime su gubici migracijom ovog hranljivog elementa smanjeni na minimum.

Preporučene količine*

Biljna vrsta	Preporučene doze đubriva u toku jedne proizvodne sezone (kg/ha)
Uljana repica	200-350
Kukuruz	150-300
Pšenica	100-270
Ječam	100-270
Suncokret	100-250
Šećerna repa	100-200

* **Napomena:** vrednosti u tabeli su okvirne, tačna količina određuje se nakon analize svakog zemljišta N-min metodom.

FORTE 30

Osnovne karakteristike

FORTE 30 predstavlja kombinaciju azota i sumpora u odnosu 30,5% N i 14% S. Od ukupne količine azota 12% vodi poreklo iz AS-a (Amon sulfata), a 18,5% iz URE-e. Sumpor se nalazi u obliku SO₃.

FORTE 30 ima dva oblika **azota** brzodelujući amonijačni (NH₄) i sporodelujući amidni (NH₂).

Amonijum jon teže je pokretan u zemljištu čime se eventualni gubici ovog hranljivog elementa umanjuju.

Preporučene količine*

Biljna vrsta	Preporučene doze đubriva u toku jedne proizvodne sezone (kg/ha)
Uljana repica	200-550
Kukuruz	200-500
Pšenica	200-450
Ječam	200-450
Suncokret	200-400
Šećerna repa	150-350

